



CENTRE HOSPITALIER
AGEN - NERAC


**CENTRE DE LUTTE ANTI-TUBERCULEUSE
DU LOT ET GARONNE**

CLAT 47

☎ 05.53.69.74.24

☎ 06.27.66.51.07

@ clat@ch-agen-nerac.fr





LA TUBERCULOSE maladie

C'est une maladie contagieuse due à une mycobactérie, le Bacille de Koch (BK), Elle peut toucher tout l'organisme (reins, ganglions, os...) mais atteint le plus souvent les poumons. **La tuberculose pulmonaire est contagieuse.**

TRANSMISSION



Elle se fait par **voie aérienne**. Une personne malade rejette du BK dans l'air lorsqu'elle tousse, parle, éternue ou se mouche.

Lors de **contacts répétés, réguliers, rapprochés avec une personne malade, on peut respirer du BK**. L'entrée du BK dans le corps se fait par les voies respiratoires puis va se fixer n'importe où dans l'organisme.

Selon la fragilité de chaque personne, il existe plus ou moins de risques de déclarer la maladie.

Tout le monde peut attraper la tuberculose car c'est une maladie contagieuse

Mais certaines personnes sont **plus à risques** en raison de **défenses immunitaires affaiblies**:

- Les enfants surtout en bas âge
- Les personnes âgées
- Les diabétiques
- Les personnes séropositives pour le VIH ou atteintes du SIDA
- Les personnes en cure de chimiothérapie ou ayant un traitement qui diminue les défenses immunitaires (ex anti TNF)
- Les personnes souffrant de malnutrition
- Les personnes addictes à l'alcool ou au tabac



D'autres personnes sont à risque **du fait de leur exposition**

- Les personnes exposées à des conditions de vie difficiles
- Les personnes vivant au contact de personne malade de la tuberculose
- Les professionnels soignants



LA TUBERCULOSE maladie SYMPTÔMES

- Toux
- Crachats sanglants
- Fièvre
- Fatigue
- Sueurs nocturnes
- Perte de poids
- Perte d'appétit



Les signes de la maladie sont plus ou moins marqués selon les cas.

LA TUBERCULOSE maladie

LA CONTAGIOSITÉ

Un malade atteint de tuberculose pulmonaire est contagieux si on peut retrouver du bacille de Koch dans ses expectorations (ses crachats) soit à l'examen direct soit après mise en culture.

Plus le nombre de bacilles retrouvés est élevé, plus le malade est contagieux.

Une personne atteinte de **tuberculose non pulmonaire** n'est **pas contagieuse** en général.




COMMENT ÉVITER DE LA TRANSMETTRE

Port du masque +++++

Éviter le contact avec des personnes fragiles: enfants, personnes âgées, immunodéprimés, femmes enceintes.

Aérer les pièces.



Inutile de tout désinfecter : la **transmission est seulement aérienne**

Ne se transmet pas en serrant les mains, avec les couverts de table, les verres, les vêtements et draps de lit...

L'INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE

Si on est en **contact étroit, répété et prolongé** avec une **personne malade de tuberculose pulmonaire contagieuse**, on peut **respirer le bacille tuberculeux BK**.

Dans la plupart des cas, nos défenses immunitaires nous protègent et éliminent le bacille. **Parfois le BK n'est pas totalement éliminé et peut rester endormi dans l'organisme** : on parle alors **d'infection tuberculeuse latente ITL**.

En cas d'ITL, on ne présente pas de symptôme, et **on n'est pas malade ni contagieux**.



Mais si un jour, les défenses immunitaires s'affaiblissent, le BK peut se réveiller, se développer et **une tuberculose maladie** peut apparaître.



**Différences
Entre
Tuberculose
Maladie
Et
Infection
Tuberculose
latente**

Tuberculose Maladie pulmonaire

Toux, crachats, fièvre,
amaigrissement

Radio pulmonaire
anormale
IDR ou test IGRA
positif

Contagiosité et
isolement
Port masque

Traitement pour guérir
de la maladie
De 6 à plus de 12
mois

Infection Tuberculeuse latente




Pas de
symptômes

Radio pulmonaire
normale
IDR ou test IGRA
positif

Pas de contagiosité
Pas d'isolement
Traitement pour
prévenir la maladie
6 à 9 mois
ou surveillance
radiologique

LE DÉPISTAGE

L ENQUÊTE AUTOUR D UN CAS



Lorsqu'une personne est atteinte de tuberculose pulmonaire, il est indispensable de faire un dépistage dans son entourage à la **recherche d' autre cas de tuberculose.**

Cela permet de **soigner au plus tôt toutes les personnes infectées** et ainsi **limiter les risques de transmission de la maladie**.


Il est donc nécessaire que toutes les personnes qui ont été en contact prolongé avec un malade contagieux bénéficient d'un dépistage. Celui-ci est réalisé seulement **si accord du malade** dans son milieu familial, amical, professionnel et social.

Les personnes « contacts » seront définies avec le CLAT et selon les critères de contagiosité du malade.

Le dépistage peut être réalisé avec le médecin traitant ou au sein du CLAT

LE DÉPISTAGE

EN QUOI CONSISTE UN DÉPISTAGE DE TUBERCULOSE



- un **examen médical**,
- une **radiographie pulmonaire dès que possible** pour confirmer l'absence d'image de tuberculose maladie active.
- et un **test immunologique IDR en 2 étapes**: une **injection** et une **lecture 48 à 72h** après et/ou un **test sanguin IGRA** à faire **entre 8 et 12 semaines** du dernier contact avec le sujet malade dans le cadre des enquêtes cas contact.



INFORMATIONS PRATIQUES

Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse de Lot-et-Garonne (CLAT 47)

Pour une question ou pour prendre rendez-vous :

☎ : 05 53 69 74 24

☎ : 06 27 66 51 07

@ : clat@ch-agen-nerac.fr

✉ Centre Hospitalier Agen-Nérac - site de Saint Esprit
Route de Villeneuve
47000 AGEN

Venir au CLAT :

- lundi : de 9h00 à 16h45
- du mardi au vendredi : de 8h30 à 16h15
(consultations sur rendez-vous uniquement)